

DOLOMETINA® PLUS

Diclofenaco sódico + Vit. B1 + B6 + B12

Comprimidos recubiertos - Vía oral

COMPOSICIÓN

Cada comprimido recubierto contiene:

Diclofenaco sódico.....	50 mg
Tiamina clorhidrato.....	50 mg
Piridoxina clorhidrato.....	50 mg
Cianocobalamina.....	1000 mcg
Lactosa y otros excipientes, c.s.	

PROPIEDADES

DOLOMETINA® PLUS es un preparado que combina la acción neurotrópica de las vitaminas B1, B6 y B12, con la acción analgésica y antiinflamatoria del diclofenaco de sodio, perteneciente a los antiinflamatorios no esteroideos (AINEs).

INDICACIONES

DOLOMETINA® PLUS está indicado en neuritis y polineuritis. Neuralgias, lumbago, síndrome cervical, lumbar, ciática, neuralgia del trigémino, herpes zoster y como coadyuvante de neuropatías crónicas que cursan con fuertes dolores. En mialgias como tortícolis, lumbalgias y miopatías mielopáticas. Dolores traumáticos. En estados dolorosos asociados a inflamación, como: artritis reumatoide, reumatismo, artropatías inflamatorias, esguinces, osteoartritis y espondilitis anquilosante.

POSOLOGIA

Adultos: la dosis diaria inicial es de 1 comprimido de DOLOMETINA® PLUS cada 8 – 12 horas con un poco de líquido sin masticar. La dosis de DOLOMETINA® PLUS puede variar a criterio del médico, dependiendo del tipo de afección e intensidad del dolor.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad conocida al diclofenaco o al ácido acetilsalicílico. Las reacciones pueden incluir asma (dificultad para respirar), urticaria o rinitis aguda (inflamación de la mucosa nasal).
Insuficiencia hepática o insuficiencia renal.
Alteraciones en la coagulación de la sangre.
Antecedentes de úlcera, hemorragia o perforaciones gástricas o intestinales.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Si padece la enfermedad de Crohn o una colitis ulcerosa pues los medicamentos con Diclofenaco sódico pueden empeorar estas patologías.
Este tipo de medicamentos pueden producir retención de líquidos, especialmente en pacientes con Insuficiencia cardíaca y/o tensión arterial elevada (hipertensión).

Embarazo y lactancia

No se recomienda el uso de DOLOMETINA® PLUS en embarazo y lactancia. No se recomienda la administración durante el primer y segundo trimestre del embarazo salvo que se considere estrictamente necesario. En estos casos la dosis y duración se limitará al mínimo posible.

REACCIONES ADVERSAS

Algunas veces se han observado: dolor de estómago, náuseas, vómitos, diarrea, calambres abdominales, digestiones dificultosas (dispepsia), flatulencia, falta de apetito, dolor de cabeza, mareos, vértigo, erupciones en la piel.

INTERACCIONES

DOLOMETINA® PLUS puede interactuar con: medicamentos que contienen litio (como metotrexato o ciclosporina); digoxina; medicamentos para la hipertensión; medicamentos para la diabetes (excepto la insulina); Miso-prostol; Colestiramina y colestipol; Pantazocina; diuréticos; medicamentos para prevenir coágulos en la sangre; corticoides; antibacterianos quinolonas, ceftriaxona; otros medicamentos del mismo grupo de Diclofenaco como ácido acetilsalicílico o ibuprofeno.

SOBREDOSIS

En caso de sobredosis, contactar inmediatamente con el médico o farmacéutico. El tratamiento debe ser sintomático y de soporte. Se recomienda el lavado gástrico y la administración de carbón activado si es durante las primeras horas post-ingestión.

PRESENTACIONES

Caja con 120 comprimidos.

CONSERVACIÓN

Almacenar a temperatura inferior a 30° C.

**Producto medicinal mantener fuera del alcance de los niños.
Venta bajo prescripción médica.**



Fabricado por:
Richam Internacional S.A. - Guatemala
Para: **MOBA, S.A. - Guatemala**