

HEPAMOB®

Silimarina + Complejo B

Comprimidos Recubiertos - Vía oral

COMPOSICIÓN

Cada comprimido recubierto contiene:

Silimarina al 80%.....	94.00	mg
Tiamina HCl.....	5.00	mg
Riboflavina base.....	5.00	mg
Piridoxina HCl.....	5.00	mg
Cianocobalamina.....	5.00	mcg
Nicotinamida.....	15.00	mg
Lactosa y otros excipientes, c.s.		

PROPIEDADES

SILIMARINA + Complejo B MOBA® es un preparado que se utiliza como auxiliar para el tratamiento de enfermedades hepáticas y cirróticas, combina la acción hepatoprotectora de la Silimarina, con vitaminas del complejo B, para asegurar un aporte completo para compensar las cantidades requeridas de vitaminas del complejo B por un hígado deficiente y con una actividad metabólica reducida, lo cual hace que el medicamento posea acción antitóxica, propiedades hepatoregeneradoras y normalizadoras de la célula hepática.

La Silimarina inhibe la oxidación y el catabolismo de los lípidos en las membranas del hepatocito, evitando la formación de peróxidos que es el mecanismo por el cual numerosos tóxicos lesionan el funcionamiento y la estructura de la célula hepática. Logrando la recuperación de las células hepáticas ya lesionadas.

INDICACIONES

SILIMARINA + Complejo B MOBA® está indicado como coadyuvante en la terapia de las lesiones tóxicas del hígado, incluyendo: alcoholismo, uso crónico de fármacos hepatotóxicos, hepatitis, hepatosis agudas, sub-agudas y crónicas, así como cirrosis, intoxicación por tetracloruro de carbono, solventes orgánicos, fosfatos y otros tóxicos.

POSOLOGIA

Según criterio del médico tratante. Se sugiere:

Adultos: la dosis es de 1 comprimido tres veces al día, después de las comidas, durante un período de 4 a 6 semanas.

Dosis de mantenimiento: 1 comprimido dos veces al día.

CONTRAINDICACIONES, INTERACCIONES, EFECTOS SECUNDARIOS

No se han descrito.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Embarazo y lactancia:

Si está cree estar embarazada consulte a su médico antes de tomar este medicamento. El consumo de alimentos durante el embarazo puede ser peligroso para el embrión y debe ser monitoreado por el médico.

SOBREDOSIS

En caso de sobredosis, contactar inmediatamente con el médico o farmacéutico. El tratamiento debe ser sintomático y de soporte. Llevar al paciente al hospital más cercano.

PRESENTACIONES

Caja con 10, 30 comprimidos. Caja dispensadora con 100 comprimidos.

CONSERVACIÓN

Almacenar a temperatura inferior a 30° C.

**Producto medicinal mantener fuera del alcance de los niños.
Venta bajo prescripción médica.**



Fabricado por:
Richam Internacional S.A. - Guatemala
Para: **MOBA, S.A. - Guatemala**