

MUCOX®

Ambroxol HCl / Clenbuterol HCl

Jarabe - Vía oral

COMPOSICIÓN

Cada 100 mL de jarabe contiene:

Ambroxol clorhidrato.....150 mg
Clenbuterol clorhidrato0.1 mg
Excipientes, c.s.

Cada 5 mL de jarabe (una cucharadita) contiene:

Ambroxol clorhidrato.....7.5 mg
Clenbuterol clorhidrato0.005 mg
Excipientes, c.s.

PROPIEDADES

MUCOX® es un medicamento que combina dos principios activos:

- Ambroxol, que pertenece al grupo de mucolíticos que actúan disminuyendo la viscosidad del moco, fluidificándolo y facilitando su eliminación.
- Clenbuterol, que pertenece al grupo de broncodilatadores, que se utilizan en el manejo de la obstrucción de las vías respiratorias, sobre todo en asma y en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

INDICACIONES

MUCOX® está indicado para tratar enfermedades agudas y crónicas de las vías respiratorias que cursan con retención de secreciones y broncoespasmo.

Por su acción mucolítica y broncodilatadora se utiliza en bronquitis, enfermedades crónicas obstructivas pulmonares y asma bronquial.

POSOLOGIA

Adultos y adolescentes (a partir de los 12 años de edad): tomar 15 – 20 mL (3 – 4 cucharaditas) dos o tres veces al día.

Niños de 6 a 12 años de edad: tomar 15 mL (3 cucharaditas) dos veces al día.

Niños de 4 a 6 años de edad: tomar 10 mL (2 cucharaditas) dos veces al día.

Niños de 2 a 4 años de edad: tomar 7.5 mL (1 ½ cucharadita) dos veces al día.

Niños de 8 a 24 meses (8 – 12 kg de peso corporal): tomar 5 mL (1 cucharadita) dos veces al día.

Lactantes hasta 8 meses (4 – 8 kg de peso corporal): tomar 2.5 mL (½ cucharadita) dos veces al día.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad al ambroxol, clenbuterol o a cualquiera de los componentes de la fórmula.

No utilizar en pacientes con cardiomiopatía hipertrófica obstructiva, tirotoxicosis y taquiarritmia.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

El uso de MUCOX® junto con otros broncodilatadores simpaticomiméticos deberá utilizarse únicamente bajo estricta supervisión médica. Sin embargo, los broncodilatadores anticolinérgicos pueden ser inhalados de forma simultánea.

MUCOX® no está indicado para el tratamiento sintomático de ataques agudos de asma.

Evaluar riesgo-beneficio en las siguientes condiciones: diabetes mellitus no controlada, infarto al miocardio reciente, alteraciones cardíacas severas, feocromocitoma e hipertiroidismo.

Embarazo, lactancia y fertilidad

Si está embarazada o en periodo de lactancia, o cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento.

Si está embarazada o amamantando a un bebé, no se recomienda que tome MUCOX®.

Conducción y uso de máquinas

A la dosis recomendada, no se espera que MUCOX® provoque somnolencia o le haga disminuir su capacidad de atención. No obstante, muy raramente algunas personas experimentan somnolencia, que puede afectar a su capacidad para conducir o usar máquinas.

INTERACCIONES

Beta adrenérgicos, anticolinérgicos, derivados de la xantina (teofilina) y los corticosteroides pueden incrementar el efecto del clenbuterol. La administración concomitante de otros betamiméticos, anticolinérgicos de absorción sistémica y derivados de la xantina (teofilina) pueden aumentar los efectos adversos del clenbuterol.

EFFECTOS SECUNDARIOS

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

Se han observado los siguientes efectos adversos: Nerviosismo, cefaleas, tremor, taquicardia, palpitaciones, vómito, náusea, diarrea, dispepsia y resequedad de la boca. Rash, espasmos musculares y mialgia.

Si en caso usted observa alguna otra reacción al medicamento, por favor comuníquelo a su médico o al farmacéutico.

INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO

En caso de una sobredosis del medicamento, se recomienda consultar con el médico y llevar al paciente al hospital más cercano. Aplicar medidas sintomáticas. No se espera que una sobredosis accidental cause problemas graves.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Consérvese a temperatura inferior a 30° C.

PRESENTACIÓN

Caja conteniendo frasco con 120 mL.

**Producto medicinal mantener fuera del alcance de los niños.
Venta bajo prescripción médica.**



Fabricado por:
Laboratorios Bonin S.A. - Guatemala
Para: **MOBA, S.A. - Guatemala**