

RELAJAMED® 4 mg

Tiocolchicósido

Comprimidos - Vía oral

COMPOSICIÓN

Cada comprimido contiene:

Tiocolchicósido4 mg

Lactosa y otros excipientes, c.s.

FARMACODINAMIA

El tiocolchicósido es un derivado natural de la colchicina, su principal acción farmacológica es: miorelajante o relajante muscular. Suprime o atenúa considerablemente la contractura de origen central: en la hipertonía espástica, disminuye la resistencia pasiva del músculo al estiramiento y reduce o suprime la contractura residual.

El principal mecanismo de acción del tiocolchicósido es mediante su unión selectiva de los receptores GABA y su consecuente activación, lo cual ocasiona un efecto relajante muscular y un efecto analgésico a nivel central.

Se han demostrado los siguientes efectos farmacológicos con tiocolchicósido: acción relajante del músculo esquelético, actividad antiinflamatoria, efecto analgésico y actividad anestésica a nivel local.

Otros beneficios clínicos que se logran con tiocolchicósido en el tratamiento del espasmo muscular son: Mejoría del dolor en reposo, mejoría del dolor al movimiento pasivo y activo, mejoría de la limitación funcional, mejoría de la postura antálgica y coadyuvante en la recuperación post-operatoria de cirugía ortopédica.

FARMACOCINÉTICA

Después de su administración por vía oral, su absorción es rápida y se logran concentraciones máximas (Cmax) en un tiempo máximo (Tmax) de 0.5 a 1 hora. La vida media de eliminación plasmática oscila entre 2 y 6 horas.

INDICACIONES

RELAJAMED® se recomienda en el tratamiento de las contracciones musculares dolorosas en:

- Trastornos vertebrales degenerativos
- Afecciones espásticas:
 - Tortícolis
 - Dorsalgia
 - Lumbalgia
 - Ciática
- Afecciones traumatológicas y neurológicas (espásticas)
- Rehabilitación funcional
- Manejo del espasmo muscular en pacientes con traumatismos y/o post-operatorio

POSOLOGIA

Adultos: La dosis usual recomendada es de 2 comprimidos de 4 mg dos veces al día durante 5 a 7 días.

En tratamientos prolongados, la posología se puede reducir hasta a 1 ó 2 comprimidos al día, incluso cada 48 horas.

Para sesiones de fisioterapia administrar 1 a 2 comprimidos 1 a 2 horas antes de iniciar la sesión.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad al tiocolchicósido o a la colchicina o a cualquiera de los componentes del producto.

Embarazo y lactancia.

No se recomienda el uso de RELAJAMED® en pacientes con diagnóstico o antecedente de enfermedad convulsiva, pacientes con lesión cerebral, alteración de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica o en aquellos con factores de riesgo o predisposición a desarrollar síndrome convulsivo.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Reducir la posología si el uso oral provoca diarrea. Eventualmente, ingerir los comprimidos con un protector gástrico.

Se debe tener precaución con RELAJAMED® en pacientes con alteración de la función renal y/o hepática.

INTERACCIONES

Se ha establecido que dadas las propiedades de unión a las proteínas plasmáticas y a las células del compartimiento sanguíneo por parte del tiocolchicósido, se estima una baja probabilidad de presentar desplazamiento de sus sitios de unión por causa de interacciones con otros fármacos.

EMBARAZO Y LACTANCIA

El uso de RELAJAMED® durante el embarazo está contraindicado.

Dado que tiocolchicósido pasa a la leche materna, su uso durante la lactancia está contraindicado.

EFFECTOS SECUNDARIOS

RELAJAMED® es un medicamento seguro y bien tolerado. En estudios clínicos con tiocolchicósido no se han registrado reacciones adversas significativas.

Algunos de los efectos secundarios más frecuentemente reportados son: cefalea, dispepsia, epigastralgia, piro-sis, alteración en la consistencia de las heces y/o diarrea, gastralgia, náusea y vómitos.

Otras reacciones alérgicas como: eritema, rash, dermatitis, prurito, urticaria, angioedema, broncoespasmo y excepcionalmente shock anafiláctico.

INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO

En caso de una sobredosis del medicamento, se recomienda consultar con el médico y llevar al paciente al hospital más cercano. Aplicar medidas sintomáticas.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Consérvese a temperatura inferior a 30° C.

PRESENTACIÓN

Caja con 10 comprimidos y caja dispensadora con 100 comprimidos.

**Producto medicinal mantener fuera del alcance de los niños.
Venta bajo prescripción médica.**



Fabricado por:
Richam Internacional S.A. - Guatemala
Para: **MOBA, S.A. - Guatemala**