

MOBAFORMINA 850®

Metformina 850 mg

Tabletas recubiertas
Antidiabético oral

COMPOSICION

Cada tableta recubierta contiene:
Metformina Clorhidrato.....850 mg
Excipientesc.s.

DESCRIPCION

MOBAFORMINA® es un medicamento que contiene como ingrediente activo la metformina clorhidrato la cual es utilizada para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 (diabetes no insulino dependiente) específicamente para regular los niveles de glucosa en la sangre. Este efecto se logra disminuyendo la cantidad de glucosa producida por el hígado y aumentando la acción de la insulina en el músculo y la grasa, permitiendo que la insulina producida por el cuerpo trabaje mejor en la reducción de la cantidad de glucosa en la sangre.

INDICACIONES

MOBAFORMINA® está indicado en el tratamiento de diabetes mellitus tipo 2 cuando el nivel de azúcar en la sangre no se puede controlar de manera adecuada con dieta, ejercicio físico y reducción de peso. También es útil en los casos de fallas primarias y secundarias a otros hipoglucemiantes orales y en pacientes diabéticos en tratamiento con sulfonilureas con tendencia al aumento de peso.

DOSIS Y ADMINISTRACION

Vía de administración oral, con las comidas o inmediatamente después de comer.

La dosis puede ser diferente para cada paciente. Siga las instrucciones que le dé su médico en cuanto a la dosis, la hora de tomar el medicamento, la dieta y la actividad física.

A continuación, se presentan las dosis promedio usuales:

Adultos: una tableta de 850 mg al día tomada con el desayuno. El médico puede variar la dosis de manera gradual después de dos semanas de tratamiento dependiendo de la respuesta del paciente. Por lo general se recomienda iniciar el tratamiento con dosis baja (850 mg una vez al día) aumentando progresivamente si fuera necesario hasta llegar a 850 mg dos a tres veces al día con las comidas. La dosis máxima diaria no debe superar los 3 gramos. En pacientes ancianos la dosis debe ajustarse basada en su función renal.

Niños menores de 10 años: la dosis debe ser establecida por el médico y dependerá de la evaluación riesgo/beneficio.

PRECAUCIONES

Lea con atención e infórmele a su médico en los siguientes casos:

- Infórmele a su médico si usted es alérgico a alguno de los componentes de la fórmula o a cualquier otra medicina o comida. Especial atención en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 o insulino dependiente.
- **Embarazo y Lactancia:** su uso y dosificación deberá ser exclusivamente bajo indicación y supervisión del médico.
- En pacientes de edad avanzada con deterioro de la función renal

y pacientes con desnutrición severa deberá ser bajo indicación y supervisión del médico.

- **Uso con otros medicamentos o alimentos:** si usted se está administrando otros medicamentos, infórmele a su médico, especialmente en caso de usar anticoagulantes y fibrinolíticos porque se puede potencializar su efecto. Si está tomando vitamina B12, la metformina puede inhibir su absorción. Si se **ingiere alcohol se puede potencializar el efecto antihiperglucemiante e hiperlactagénico de la metformina.** Infórmele a su médico si está utilizando cimetidina, digoxina, furosemida, morfina, procainamida, quinidina, quinina, ranitidina, trimetoprim o vancomicina porque cualquiera de estos medicamentos puede incrementar los niveles de metformina en sangre.

- Si usted padece alguno de los siguientes problemas médicos debe informarle a su médico: acidosis láctica, deshidratación, diarrea, cambios hormonales, fiebre, infección, cetonas en la orina, estrés mental, problemas severos con los intestinos, vómitos, problemas del corazón o problemas hepáticos.

EFFECTOS NO DESEADOS

Al igual que con otros medicamentos se pueden presentar efectos no deseados, entre ellos los más comunes pueden ser: trastornos gastrointestinales como náuseas, dolor de estómago, vómitos, diarrea y anorexia.

La administración puede provocar acidosis láctica principalmente en pacientes con insuficiencia renal, hepática, cardíaca o asociada al abuso de ingesta de alcohol.

USO ADECUADO DEL MEDICAMENTO

- No tome más dosis, ni con mayor frecuencia, ni por más tiempo del indicado por su médico.

- Si usted olvida tomar una dosis, converse inmediatamente con su médico para que le indique como tomarla. No duplique la dosis.

- Tome este medicamento durante el tiempo de tratamiento que le indicó su médico.

- Cuando se ha alcanzado un control adecuado de la glicemia puede reducirse la dosis gradualmente.

- Es recomendable tomar el medicamento con las comidas o inmediatamente después de las comidas.

PRESENTACION

Caja conteniendo 30 tabletas recubiertas.

RECOMENDACIONES SOBRE ALMACENAMIENTO

Almacenar a temperatura no mayor a 30°C.

Producto medicinal mantener fuera del alcance de los niños.
Venta bajo prescripción médica.



Fabricado por:
Wexford Laboratories Pvt., Ltd. India
Para: **MOBA, S.A. - Guatemala**